

# OBVESTILO ZA OSEBE CEPLJENE PROTI COVIDU-19



Spoštovani,

prejeli ste cepivo proti covid-19. Tako kot vsako cepljenje, ima tudi cepljenje proti covid-19 neželene učinke, ki pa so običajno blagi do zmerni in prehodni. V naslednjih dveh dneh se lahko pojavijo bolečina, oteklina in/ali rdečina na mestu cepljenja, utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, mrzlica, povišana telesna temperatura, slabost, bruhanje, oteklost bezgavk, ki pa običajno izzvenijo v nekaj dneh po cepljenju. Te reakcije so pričakovane in kažejo, da se je vaš imunski sistem odzval na cepljenje.

Po cepljenju s cepivi proti covid-19 Vaxzevria in Janssen so poročali o izjemno redkih primerih pojava krvnih strdkov s sočasnim znižanjem števila trombocitov (težki primeri s pretiranim strjevanjem ali krvavitvami po telesu) v prvih 1-3 tednih po cepljenju, večinoma pri ženskah mlajših od 60 let (vendar je to lahko odraz povečane uporabe cepiva v tej starostni skupini žensk). Če se po cepljenju pojavijo hujše zdravstvene težave (zasoplost, bolečina v prsah ali vztrajna bolečina v trebuhu, otekanje nog, vztrajen močan glavobol, zamegljen vid, številne majhne modrice, podplutbe), ali te ne izzvenijo v nekaj dneh, svetujemo, da poiščete zdravniško pomoč.

Po cepljenju s cepivoma Vaxzevria in Janssen so poročali o izjemno redkih primerih sindroma kapilarnega prepuščanja. Če se vam v dneh po cepljenju pojavi hitro otekanje rok in nog ter nenadno povečanje telesne mase, pridružen pa je lahko tudi občutek omedlevice (zaradi nizkega krvnega tlaka), svetujemo, da takoj poiščete zdravniško pomoč.

Po cepljenju s cepivi Comirnaty in Spikevax so poročali o zelo redkih primerih miokarditisa (vnetje srčne mišice) in perikarditisa (vnetje mreže, ki obdaja srce), ki so se pojavili predvsem v prvih 2 tednih po cepljenju, pogosteje po prejemu drugega odmerka in pogosteje pri mlajših moških. Če se po cepljenju pojavijo kratka sapa (zadihanost), palpitanje (občutek razbijanja srca) ali bolečine v prsnem košu, svetujemo, da poiščete zdravniško pomoč.

**Ker se pri bolezni covid-19 lahko pojavijo resni zapleti, so koristi cepljenja pri preprečevanju covid-19 večje od tveganja zaradi neželenih dogodkov po cepljenju.**

**Hvala, da ste pristopili k cepljenju proti covid-19, s tem ste pokazali veliko odgovornost do sebe in vseh okoli vas.**