



NALEZIMO SE
**DOBRIH
NAVAD**
CEPIMO SE

NIJZ Nacionalni inštitut
za javno zdravje

Obvestilo o cepljenju vašega otroka proti covidu-19

Spoštovani,

vaš otrok je prejel cepivo proti covidu-19. Tako kot vsako cepljenje, ima tudi cepljenje proti covidu-19 lahko neželene učinke, ki pa so običajno blagi do zmerni in prehodni. V naslednjih dveh dneh se lahko pojavijo bolečina, rdečina in/ali oteklina na mestu cepljenja, utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, mrzlica, povišana telesna temperatura, slabost, bruhanje, oteklost bezgavk, ki pa običajno izzvenijo v nekaj dneh po cepljenju. Te reakcije so pričakovane in kažejo, da se je imunski sistem vašega otroka odzval na cepljenje.

Po cepljenju s cepivom **Comirnaty** so poročali o zelo redkih primerih miokarditisa (vnetje srčne mišice) in perikarditisa (vnetje osrčnika), ki so se pojavili predvsem v prvih dveh tednih po cepljenju, pogostejše po prejemu drugega odmerka in pogostejše pri mlajših moških. Če se pri vašem otroku po cepljenju pojavijo bolečine v prsnem košu, težko dihanje in/ali občutek razbijanja srca, svetujemo, da nemudoma poiščete zdravniško pomoč.

Tveganje za resne zaplete bolezni covid-19 je bistveno večje od tveganja za resne neželene učinke po cepljenju proti covidu-19.

Hvala,
ker ste se odločili za cepljenje vašega otroka proti covidu-19.

S tem ste pokazali veliko odgovornost za njegovo zdravje
in zdravje vseh okoli vas.

